

telefono
fax
e-mail
web

via Dogana 16
6501 Bellinzona

+41 91 814 40 02
+41 91 814 44 46
dss-umc@ti.ch
www.ti.ch/med

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

**Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona**

Ai medici
con libero esercizio nel Cantone Ticino

(per il tramite dell'OMCT)

Bellinzona 28 dicembre 2023

Ns. riferimento **info med – VACCINAZIONI**

Calendario vaccinale - novità 2024

Gentile collega,

il Calendario vaccinale 2024 di prossima pubblicazione contiene alcune nuove raccomandazioni vaccinali che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

1. Vaccinazione complementare contro il sierogruppo B del meningococco per lattanti, bambini e adolescenti

Raccomandazione di **vaccinazione complementare per i lattanti e i bambini**: la vaccinazione contro i meningococchi di sierogruppo B è ora raccomandata per tutti i lattanti e i bambini piccoli come vaccinazione complementare per fornire loro una protezione ottimale contro la rara ma spesso grave malattia meningococcica invasiva causata dal sierogruppo B.

Si raccomanda uno schema a 3 dosi con una dose di vaccino a 3, 5 e 12-18 mesi di età (2 dosi di vaccino nel primo anno di vita, con un intervallo minimo di 2 mesi; 3^a dose nel secondo anno di vita, almeno 6 mesi dopo la 2^a dose).

Raccomandazione **complementare per gli adolescenti**: la vaccinazione contro il meningococco del sierogruppo B è ora raccomandata per tutti gli adolescenti di età compresa tra 11 e 15 anni. Si raccomanda uno schema a 2 dosi con un intervallo minimo di 1 mese. La vaccinazione può essere somministrata contemporaneamente alla vaccinazione contro i sierogruppi ACWY.

2. Vaccinazione complementare contro i meningococchi dei sierogruppi ACWY: adeguamento della finestra vaccinale per la vaccinazione nell'infanzia

La **vaccinazione complementare** contro i meningococchi dei sierogruppi A, C, W e Y nei lattanti è ora raccomandata all'età di 12-18 mesi (in precedenza a 24 mesi). Ciò è dovuto all'estensione dell'età di autorizzazione dei vaccini contro i meningococchi ACWY. La vaccinazione fornisce ai lattanti una protezione ottimale contro la rara ma spesso grave malattia meningococcica causata da questi sierogruppi.

All'età di 12-18 mesi, si raccomanda uno schema a 1 o 2 dosi, a seconda del vaccino utilizzato (schema a 2 dosi con un intervallo minimo di 2 mesi). La vaccinazione può essere somministrata

contemporaneamente alla 3^a dose di vaccinazione contro il meningococco di sierogruppo B raccomandata nella stessa classe di età.

Riassumendo per quanto concerne la vaccinazione contro i meningococchi dei sierogruppi B e ACWY

- **contro i meningococchi ACWY:** tra 12 e 18 mesi: 1 dose di **MenQuadfi**[®] (Sanofi-Aventis) o 2 dosi di **Menveo**[®] (GSK) a 2 mesi d'intervallo; a partire da 24 mesi e in adolescenza: 1 dose qualunque sia il vaccino;
- **contro i meningococchi B:** 3 (2+1) dosi di **Bexsero**[®] (GSK) se vaccinazione iniziata prima dei 12 mesi, 2 dosi se dopo i 12 mesi (compreso per gli adolescenti!)

Età di vaccinazione	MCV-ACWY		4CMenB (Bexsero [®])	
	12-18 mesi	11-15 anni	3,5,12-18 mesi*	11-15 anni
Numero di dosi e intervalli	1 dose MenQuadfi [®] oppure 2 dosi di Menveo [®] (intervallo minimo 2 mesi)	1 dose	3 dosi (2 dosi < 12 mesi, intervallo min. 2 mesi; 3 ^a dose ≥ 12 mesi, min. 6 mesi dopo la 2 ^a dose)	2 dosi (intervallo minimo 1 mese)
Vaccinazione di recupero	1 dose < 5° compleanno (Menveo [®] : 2 dosi < 2° compleanno)	1 dose < 20° compleanno	2 dosi < 5° compleanno (intervalli minimi: 2 mesi < 2 anni, 1 mese ≥ 2 anni)	2 dosi < 20° compleanno (intervallo minimo 1 mese)

MCV-ACWY: vaccini coniugati quadrivalenti contro i meningococchi; 4CMenB: vaccino ricombinante a quattro componenti del meningococco del sierogruppo B;

*: I vaccini esavalenti/PCV13 possono essere somministrati contemporaneamente o a qualsiasi intervallo a 2 e 4 mesi.

Per maggiori informazioni sulle [nuove raccomandazioni di vaccinazione complementare per la protezione dalle malattie invasive da meningococco](#) si veda il documento pubblicato dall'UFSP (disponibile solo in francese e tedesco)¹.

3. Vaccinazione complementare contro il rotavirus per tutti i neonati

La vaccinazione contro il rotavirus **Rotarix**[®] (GSK) è ora raccomandata per tutti i neonati come **vaccinazione complementare** con uno schema vaccinale a 2 dosi, a 2 e 4 mesi di età (intervallo minimo 4 settimane). La 1^a dose può essere somministrata già a 6 settimane (al più tardi a 15 settimane e 6 giorni) e la 2^a dose al più tardi a 23 settimane e 6 giorni (**controindicata dopo la 24^{esima} settimana** per un rischio aumentato di invaginazione intestinale!). Intervallo minimo di 4 settimane tra le 2 dosi. La vaccinazione viene somministrata per **via orale**.

¹<https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/ergaenzende-impfempfehlungen-invasive-meningokokkenerkrankungen.pdf.download.pdf/Recommandations%20de%20vaccination%20compl%C3%A9mentaire%20contre%20les%20maladies%20invasives%20m%C3%A9ningocoques.pdf>

Per maggiori informazioni sulla [raccomandazione di vaccinazione complementare contro i rotavirus per i neonati](#) si veda il documento pubblicato dall'UFSP (solo in francese e tedesco)².

4. Vaccinazione di base contro l'HPV per i maschi: adeguamento della categoria di raccomandazione per i ragazzi e i giovani di età compresa tra 11 e 19 anni

La vaccinazione contro l'HPV per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni (vaccinazione di recupero fino all'età di 20 anni) diventa ora una **raccomandazione di base**, mentre in precedenza era raccomandata come vaccinazione complementare per i ragazzi di questa età. La stessa raccomandazione si applica ora a tutti gli adolescenti, indipendentemente dal sesso (con 2 o 3 dosi a seconda dell'età); la raccomandazione per la vaccinazione complementare rimane in vigore dai 20 ai 26 anni.

Questo adeguamento tiene conto delle crescenti evidenze e dell'aumento dell'incidenza dei tumori associati all'HPV che colpiscono entrambi i sessi (orofaringeo, anogenitale).

Per maggiori informazioni sulla [raccomandazione di vaccinazione di base contro l'HPV per i ragazzi](#) si veda il documento pubblicato dall'UFSP (solo in francese e tedesco)³.

Nota: Ricordiamo che la vaccinazione è presa a carico dalla cassa malati unicamente se effettuata nell'ambito del Programma cantonale di vaccinazione.

5. Vaccinazione complementare contro gli pneumococchi per le persone a partire dai 65 anni

La vaccinazione contro lo pneumococco con una singola dose di vaccino anti-pneumococcico coniugato (PCV) è ora raccomandata come **vaccinazione complementare** per tutte le persone di età pari o superiore a 65 anni che non sono ancora state vaccinate contro lo pneumococco o che in precedenza (> 1 anno fa) sono state vaccinate solo con il vaccino polisaccaridico Pneumovax[®] (che non è più raccomandato). Non è attualmente raccomandata una vaccinazione di richiamo.

L'obiettivo della raccomandazione basata sull'età è quello di ottimizzare la protezione individuale contro le malattie invasive da pneumococco e la polmonite pneumococcica acquisita in comunità nel gruppo di età più colpito.

Due vaccini sono già presenti sul mercato svizzero (PCV13: Prevenar13[®], Pfizer; PCV15: Vaxneuvance[®], MSD) e un terzo (PCV20) potrebbe aggiungersi nel 2024.

Nota: Per quanto concerne le raccomandazioni di vaccinazione contro gli pneumococchi come vaccinazione di base (bambini < 5 anni) come pure le raccomandazioni per le persone a rischio ≤ 65 anni, esse sono invariate.

²<https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/ergaenzende-empfehlung-rotaviren.pdf.download.pdf/Vaccination%20contre%20les%20rotavirus%20-%20recommandations%20compl%C3%A9mentaires%20pour%20les%20nourrissons.pdf>

³<https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/hpv-basisimpfung-jungen.pdf.download.pdf/Vaccination%20de%20base%20contre%20les%20HPV%20pour%20les%20gar%C3%A7ons.pdf>

Per maggiori informazioni sulla [raccomandazione di vaccinazione complementare contro gli pneumococchi per tutte le persone a partire dai 65 anni](#) si veda il documento pubblicato dall'UFSP (solo in francese e tedesco)⁴.

6. Vaccinazione contro l'influenza stagionale per le persone ≥ 65 anni

La categoria di raccomandazione è stata modificata: la vaccinazione contro l'influenza stagionale per le persone ≥ 65 anni è ora **raccomandata come vaccinazione complementare** (in precedenza raccomandazione di vaccinazione per gruppi a rischio).


Vi ricordiamo che trovate tutte le nostre Info-medici all'indirizzo:

<https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/>

Porgo a tutti cordiali saluti e i migliori Auguri per un sereno 2024.

Il Medico cantonale

Giorgio Merlani



Copia a:

- Farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch)

⁴<https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/factsheets-impfungen/pneumokokkenimpfung-plus65.pdf.download.pdf/la-vaccination-contre-les-pneumocoques-est-desormais-recommandee-comme-vaccination-complementaire-pour-toutes-les-personnes-a-partir-de-65-ans.pdf>